

مقایسه دو روش استفاده از ژل لوبرکانت و ژل لیدوکائین حین قرار دادن ماسک حنجره ای راه هوایی بر روی عالیم همودینامیک و واکنش های خروج از بیهوشی

ابراهیم حضرتی^۱، محمدرضا رفیعی^۲، بیژن رضاخانیها^۳، شهرام طاهری^۴، بهزاد کاظمی حکی^۵

۱- گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا-۲- گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا-۳- گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا-۴- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی آجا-۵- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بیمارستان امام خمینی مهاباد گروه بیهوشی، مهاباد . ایران

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله مقاله کارآزمایی بالینی	هدف: ماسک راه هوایی حنجره ای (LMA) جهت حفظ راه هوایی و تنفس خودبخودی یا کنترله در طی اعمال جراحی کوتاه مدت استفاده می شود در عمل دیده شده است که بیماران حین جراحی بدنبال باد کردن کاف لوله LMA دچار تغییرات همودینامیک در فشار خون های سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب می شوند و یا اینکه بعد از بیهوشی دچار واکنشهای خروج از بیهوشی مثل سرفه و گلودرد و تهوع واستفراغ می شوند.
تاریخچه مقاله دریافت: ۹۶/۱۲/۱ پذیرش: ۹۶/۴/۳	مواد و روشها: مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی دو سوکور به منظور ارزیابی عالیم همودینامیک و واکنش های خروج از بیهوشی، در بیمارانی که جهت انجام واریکوسکلتومی کاندید عمل جراحی کتیبو تحت بیهوشی عمومی بودند انجام شد. قبل از شروع مطالعه کد اخلاق از سامانه جامع کارآزمائیهای بالینی کشوری دریافت شد. بیماران بصورت تصادفی ساده به دو گروه ۴۰ نفره (با استفاده از کارتنهای سیاه و سفید) شامل گروه استفاده از ژل لوبرکانت و گروه استفاده از ژل لیدوکائین حین کارگذاری LMA به میزان یک اینچ (۲/۵ سانتیمتر) تقسیم شدند. اطلاعات لازم با روش مشاهده جمع آوری و با آزمونهای آماری مربع کای و T-Student نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
کلید واژگان بیدردی ، واریکوسکلتومی ، ژل لیدوکائین .	یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گروههای مورد مطالعه به لحاظ عوامل مؤثر بر پاسخ دهی به داروهای مثل سن، وزن اختلاف معنی داری اختلاف آماری معنی دار نداشتند. همچنین در گروهی که از ژل لیدوکائین استفاده شد، تغییرات همودینامیک و واکنشهای خروج از بیهوشی کمتر از گروهی بود که ژل لوبرکانت استفاده شده بود.
نویسنده مسئول Email: m.rafiei@ajaums.ac.ir	نتیجه گیری: استفاده از ژل لیدوکائین حین کارگذاری LMA در بیماران تحت عمل جراحی واریکوسکلتومی باعث کاهش تغییرات در فشار خونهای سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب و همچنین کاهش فراوانی موارد سرفه و گلودرد و تهوع واستفراغ بعد از عمل می شود و این در حالی است که هیچگونه عارضه ناشی از افزایش کاربرد مخدر بعد از عمل بر بیمار تحمیل نشده است. همچنین مدت زمانی که در دوره بعد از عمل طول می کشد تا بیمار درخواست ضد درد کند بطور برجسته ای در گروه استفاده از ژل لیدوکائین موضعی طولانی تر می باشد. لذا می توان از کاربرد ژل لیدوکائین حین کارگذاری LMA به عنوان یک روش ضد درد ترجیحی (preemptive analgesia) مؤثر استفاده کرد.

این روش راه هوایی اغلب برای بیمارانی که در لوله گذاری معمولی مشکل داشته باشند و یا اینکه لوله گذاری غیر ممکن بوده است اندیکاسیون دارد و در مقایسه با لوله گذاری تراشه در غلظت های پایینتر داروهای بیهوشی تحمل پذیر تر است و احتمال ادم راه هوایی نیز کمتر می باشد(۴). در تحقیقات قبلی دیده شده بود که کاربرد LMA با خشونت صدا و ترومما به حلق و گلو و خشکی دهان همراه بوده است

مقدمه
عوارض انجام لوله گذاری شایع است و تا حدود ۴٪ کل بیماران را تشکیل می دهد(۱). ماسک راه هوایی حنجره ای (LMA) جهت حفظ راه هوایی و تنفس خودبخودی یا کنترله در طی اعمال جراحی کوتاه مدت استفاده می شود(۲). همچنین به عنوان اولین انتخاب حین CPR در مواردی که فرد احیاء کننده مهارت کاملی در لوله گذاری تراشه ندارد استفاده می شود(۳).

دریافت گردید که عبارت بود از:
IRCT ۱۱۷۱۶۹۰۶ N۲۰۱۶۰۱۱۷۱۶۹۰۶

کلیه بیماران با یک روش مشابه بیهوشی عمومی یعنی ابتدا با دریافت $500\text{ }\mu\text{g/kg}$ مایع پره لود وسیپس با تزریق $4\text{ }\mu\text{g/kg}$ فنتانیل IV 0.5 mg/kg آتراکوریوم و 5 mg/kg نستونال اینداکشن بیهوشی شده و در ادامه بیهوشی بوسیله ماسک و با استفاده از O_2 و اکسیژن بصورت 50% و 5 mg/kg/h پروپوفول صورت گرفت تخصیص بیماران به دو گروه بصورت Simple Random Sampling مسئول کورسازی مطالعه از ژل لوبریکانت استفاده شد. با استفاده از کارت سفید (برای بیمارانی که کارت سفید گرفتند توسط فرد کارت سیاه گرفتند از ژل لوبریکانت استفاده شد). به دو گروه استفاده از ژل لوبریکانت و گروه استفاده از ژل لیدوکائین حین کارگذاری LMA به میزان یک اینچ ($2/5$ سانتیمتر) تقسیم شدند.

بعد از جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی وضعیت دو گروه از لحاظ متغیرهایی مانند سن و وزن و فراوانی تهوع و استفراغ و سرفه و گلو درد از آزمون آماری مربع کای و برای ارزیابی متغیرمیانگین تغییرات فشار خون و ضربان قلب در دو گروه از آزمون آماری T-Student با استفاده از نرم افزار SPSS-۱۸ اسناده شد.

نتایج

در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور ۸۰ مرد بیمار کاندید عمل جراحی الکتیو واریکوسلکتومی تحت بیهوشی عمومی در دو گروه 40 نفره کارگذاری LMA با ژل لوبریکانت و با کارگذاری LMA با ژل لیدوکائین مورد بررسی قرار گرفتند. از نظر متغیرهای دموگرافیک سن و وزن دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند که گویای انتخاب نمونه ها از جامعه ای با توزیع نرمال می باشد (جدول ۱).

(۱۱-۵). در عمل دیده شده است که بیماران حین جراحی بدنبال باد کردن کاف لوله LMA دچار تغییرات همودینامیک در فشار خون های سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب می شوند و یا اینکه بعد از بیهوشی دچار واکنشهای خروج از بیهوشی مثل سرفه گلودرد و تهوع واستفراغ می شوند. بعلاوه جهت کار گذاری LMA در دهان بیمار لازم است که از یک لوبریکانت جهت تسهیل سرخوردن لوله در دهان و قرارگیری صحیح آن استفاده شود.

یکی از روشهای کنترل و تخفیف درد استفاده از روش بیدردی ترجیحی (preemptive analgesia) است که در واقع عبارت از درمان (treating pain prior to its onset) در قبل از شروع آن می باشد (۱۲). بی دردی ترجیحی در واقع یک درمان ضد دریافت درد است که با کاهش حساسیت مرکزی و محیطی باعث کاهش دامنه احساس درد می شود، از طرفی این کار می تواند بصورت محیطی یا در امتداد آکسونهای حسی و بر روی داده ها (inputs) و یا در قسمتهای مختلف سیستم عصبی مرکزی صورت گیرد (۱۳). این مطالعه جهت بررسی امکان استفاده از روش preemptive analgesia در برخورد با عوارض حضور LMA در دهان و تأثیر آن بر روی فراوانی تغییرات همودینامیک و واکنشهای خروج از بیهوشی مذکور ترتیب داده شد تا با مقایسه کار گیری ژل لوبریکانت و ژل لیدوکائین حین جاگذاری LMA این مسئله مورد مطالعه قرار گیرد.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت Double Blind RCT (کارآزمایی بر روی ۸۰ بیمار مذکور ۲۰ تا ۶۰ ساله که جهت انجام عمل جراحی واریکوسلکتومی به بیمارستان ۵۰۱ آجا مراجعه کرده بودند و بعد از توضیح کامل در مورد مراحل مختلف طرح رضایت نامه آگاهانه اعضاء نموده بودند انجام شد. (قبل از شروع مطالعه کد اخلاق از سامانه جامع کشوری کارآزمایی بالینی

جدول ۱: بررسی تغییرات دموگرافیک در دو گروه مورد مطالعه

P-value	استفاده از ژل لوبریکانت	استفاده از ژل لیدوکائین	متغیر
0.071	$22/21 \pm 0.93$	$23/24 \pm 0.26$	سن
0.084	$56/70 \pm 7/1$	$54/37 \pm 6/12$	وزن

LMA با استفاده از ژل لیدوکائین بطور معنی داری کمتر از گروه کارگذاری LMA با استفاده از ژل لوبریکانت بود. (جدول ۲).

میانگین تغییرات متغیرهای پارامتریک همودینامیک فشارخون های سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب در گروه کارگذار

جدول ۲: بررسی تغییرات همودینامیک در دو گروه مورد مطالعه

P-value	استیغاده از ژل لوبریکانت	استیغاده از ژل لیدوکائین	متغیر
0.28	$129/4 \pm 13/8$	$119/3 \pm 22/2$	میانگین فشار خون سیستولیک
0.017	$79/2 \pm 15/7$	$68/3 \pm 10/3$	میانگین فشار خون دیاستولیک
0.036	$76 \pm 12/5$	$64/1 \pm 43/3$	میانگین ضربان قلب

داری کمتر از گروه استفاده از ژل لوبریکانت بود(جدول ۳).

همچنین فراوانی متغیرهای نان پارامتریک سرفه و گلودرد و تهوع و استفراغ در گروه استفاده از ژل لیدوکائین بطور معنی

جدول ۳: بررسی فراوانی واکنشهای خروج از بیهوشی در دو گروه مورد مطالعه:

P-value	استفاده از ژل لوبریکانت	استفاده از ژل لیدوکائین	متغیر
۰/۰۳۷	۵	۳	سرفه
۰/۰۴۱	۷	۳	گلودرد
۰/۰۴۸	۴	۲	تهوع و استفراغ

دارند، نورونهای WDR سیگنال های مهاری و تحریکی را دریافت می کنند، در صورت ایجاد آسیب بافتی ناشی از جراحی، سیگنالهای مربوط به گیرنده های درد بعد از ایجاد، باعث برآمدگی افتادن آبشاری از تغییرات در سیستم عصبی شده که از جمله آن میتوان افزایش پاسخ دهنده نورون های محیطی و مرکزی را نام برد، دریافت ممتد سیگنالهای تحریکی باعث بوجود آمدن خاطره درد (pain memory) در فرد می شوند، بیدرده ترجیحی در واقع درمانی است که قبل از عمل با مهار دریافت پذیری ایمپالسهای درد توسط گیرنده های درد شروع می شود و فعالیت آن در طول عمل جراحی ادامه می یابد و مراحل مختلف انتقال در گیرنده های درد را بلوک می کند(۲۲ و ۲۳). در مطالعه زینالی از روش روتین استفاده از ژل لوبریکانت استفاده شده و مقادیر افزایش فشار خون و ضربان قلب بطور قابل توجهی بیشتر از گروه استفاده از ژل لیدوکائین در مطالعه ما می باشد(۲۴). همچنین مقایسه مطالعه ما با مطالعه دکتر ریاحی نشان داد که از آنجایی که در روش آنها برای جاگذاری LMA از ژل لوبریکانت استفاده شده است در مقایسه با روش ما فراوانی واکنش های خروج از بیهوشی بیشتر بوده است که به نفع موثرتر بودن روش پیشنهادی مطالعه ما است(۲۵).

تقدیر و تشکر

بدینوسیله نویسندهای این مطالعه از کلیه بیمارانی که در طرح مذکور شرکت کرده اند قدردانی خود را اعلام می نمایند.

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه به بررسی تأثیر استفاده از ژل لیدوکائین بجای ژل لوبریکانت بر روی فراوانی تغییرات همودینامیک و واکنشهای خروج از بیهوشی در بیماران تحت عمل جراحی واریکوسلکتومی با بیهوشی عمومی و با استفاده کننده از LMA پرداخته شد دیده شد که میزان تغییرات متغیرهای همودینامیک (فشار خون های سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب) و واکنش های خروج از بیهوشی (سرفه و گلو درد و تهوع و استفراغ) بطور معنی داری در گروه استفاده کننده از ژل لیدوکائین کمتر از گروه استفاده کننده از ژل لوبریکانت بود. یکی از روش های کاهش درد و واکنش های مربوط به آن، ایجاد بی دردی ترجیحی از طریق مداخله در مسیرهای انتقال درد است که به طرق مختلف از جمله کاربرد بی حس کننده های موضعی، بلوک عصبی، بلوک اپیدورال، بلوک نخاعی، تزریق وربیدی ضد دردها و ضد التهاب ها صورت می گیرد(۱۸-۲۳). در مطالعه جیراسیریتام^۱ و بورگت^۲ در اعمال جراحی آنورکتال استفاده از روش بی دردی ترجیحی جهت کاهش درد بعداز عمل نیز به اثبات رسیده است(۱۹ و ۲۰).

در مطالعات متعدد نشان داده است که کاربرد LMA بدليل ترومایی که به حلق وارد می کند باعث ایجاد خشونت صدا و گرفتگی صدا می شود(۲۱). در توجیه مکانیسم این پدیده باید گفت که با کاربرد ژل لیدوکائین به عنوان لوبریکانت رسپتور های درد بلوک شده و واکنشهای ناشی از فشاره دردناک به ناحیه حلق و حنجره اعم از تغییرات همودینامیک جلوگیری می شود که همان بی دردی ترجیحی است. به عبارت دیگر گیرنده های درد(nociceptors) با تبدیل انرژی های حرارتی، مکانیکی، شیمیایی به فعالیت های الکتریکی، آنها را به شاخ خلفی نخاع منتقل می کنند، در آنجا دو دسته دیگر از nociceptive- و نورون های با محدوده دینامیک وسیع(wide-specific dynamic-range) وجود دارند، واسطه های شیمیایی متعددی مثل اسیدهای آمینه گلوتامات و آسپارتات وان متیل دی آسپارتات(N-Methyl-D-Aspartate) و ماده P در انتقال سیگنالهای درد در این نورونهای شاخ خلفی نخاع دخالت

۱- Jirasiritham

۲- Bourget

References

- 1- Martin LD, Mhyre JM, Shanks AM, et al. 3,423 emergency tracheal intubations at a university hospital: airway outcomes and complications. *Anesthesiology* 2011; 114:42.
- 2-Heringlake M,Doerges V, Ocker H, Schmucker PA. Comparison of the cuffed oropharyngeal airway(COPA) with the laryngeal mask airway (LMA) during manually controlled positive pressure ventilation. *J Clin Anesth.* 1999; 11:590-595.
- 3-American Heart Association in collaboration with International Liaison Committee on Resuscitation.Guidline 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiac management:International consensus on science. *Circulation .* 2000;102.
- 4- Barbara O'Neill ,Josephine J. Templeton , Lisa Caramico :The Laryngeal Mask Airway in Pediatric Patients.*Anesth. Analg.* October 1, 2005 101:1034-1037.
- 5- Brimacombe J. Laryngeal mask anesthesia and recurrent swallowing. *Anesth Intens Care* 1991;19:275-276.
- 6- Rieger A, Brunne B, Has I, et al. Laryngopharyngeal complaints following laryngeal mask airway and endotracheal intubation. *J Clin Anesth* 1996(in press).
- 7-Splinter WM, Smallman B, Rhine EJ, Komocar L. Postoperative sore throat in children and the laryngeal mask airway. *Can J Anaesth* 1994;41:1081-1083.
- 8-Fujii Y, Tanaka H, Toyooka H. Effects of laryngeal mask airway on circulation and on incidence of postoperative sore throat and hoarseness. *Masui* 1993;42:1559-1562.
- 9-Ferrut O, Toulouse C, Lancon JP, et al. The laryngeal mask for elective gynecologic surgery: a very attractive oral airway dispositive. *Anesth Analg* 1993;78:110.
- 10- O Neill BL, Foley EP, Chang A. Effects of humidification of inspired gases with the laryngeal mask airway. *Anesthesiology* 1994;81:52.
- 11-Alexander CA, Leach AB. Incidence of sore throats with the laryngeal mask. *Anesthesia* 1989;44:791.
- 12-Kehlet H. General vs. regional anesthesia. In: Rogers MC, Tinker JH, Covino BG, Longnecker DE (Eds.)*Principles and Practice of Anesthesiology*.St. Louis: Mosby ,1993:1218-34
- 13-Dermot J, Kelly M, Mahmood A. Preemptive analgesia I : physiological pathways and pharmacological modalities. *Canadian Journal of Anesthesia* 2001; 48:1000-1010.
- 14-Kehlet H, Dahl JB. The value of "multimodal" or "balanced analgesia" in post-operative pain treatment. *Anesth Analg* 1993;77:1048-56.
- 15-Tverskoy M, Cozakov C, Ayache M, Bradley EL,Kissin I. Postoperative pain after inguinal herniorrhaphy with different types of anesthesia. *Anesth Analg* 1990;70:29-35.
- 16-Ke RW, Portera G, Bagous W, Lincoln SR. A randomized, double-blinded trial of preemptive analgesia in laparoscopy. *Obstet Gynecol* 1998;92:972-5.
- 17-Tverskoy M, Oz Y, Isakson A, Finger J, Bradley EL, Kissin I. Preemptive effect of fentanyl and ketamine on postoperative pain and wound hyperalgesia. *Anesth Analg* 1994;78:205-9.
- 18-Souter AJ, Fredman B, White PF. Controversies in the perioperative use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Anesth Analg* 1994;79:1178-90.
- 19- Jirasiritham S, Tantivitayatan K, Jirasiritham S. Perianal blockage with 0.5% bupivacaine for postoperative pain relief in hemorrhoidectomy. *J Med Assoc Thai.* 2004 Jun;87(6):660-4.
- 20- Bourget JL ,Clark J ,Joy N .Comparing preincisional with postincisional bupivacaine infiltration in the management of postoperative pain. *Arch Surg.* 1997 Jul;132(7):766-9.
- 21-Cros AM, Pitti R, Concil C, et al. Sever dysphonia following use of laryngeal mask airway . *Anesthesiology* 1997;86:498-500.
- 22-Woolf CJ, Salter MW Neuronal plasticity: increasing the gain in pain. *Science* 2000; 288, 1765–1769.
- 23-Woolf CJ, Chong MS Preemptive analgesia -treating postoperative pain by preventing the establishment of central sensitization. *Anesth Analg* 1993;77, 362–379.
- 24-Zeinali MB. Comparative study of blood pressure and heart rate changes due to LMA vs ETT after induction of anesthesia. *Iranian Journal of Anesthesiology & Intensive Care* 2007;27:15-21.
- 25-Riahi M. LMA usage instead of ETT on patient recovery time. *Journal of Arak university of Medical Sciences* 2008.

Comparison of laryngeal mask airway insertion with lubricant jel versus lidocaine jel during varicocelectomy

Hazrati E (MD), Rafiei MR (MD)*, Rezakhaniha B (MD), Taheri S (MD), Kazemi SH (Msc)

Abstract

Background: Laryngeal mask airway (LMA) is using for control of breathing during short-period operation. The patients may experience hemodynamic changes during cuffing or cough, nausea, and vomiting after driving out the mask. This randomized double-blind study was performed to compare postoperative hemodynamic changes and emergence reactin frequencies with preoperative topical lidocaine jelly and lubricant gel in patients.

Materials and methods: Two groups of the patients consisted of 40 male in each group were candidate for elective varicocelectomy under general anesthesia. They were randomly assigned into two groups. The first group was received preoperative topical lidocaine jelly on LMA and the second group received preoperative lubricant jelly during LMA insertion. Gathered data was analyzed with SPSS-18 software using Chi – square and T-Student tests.

Results: Two groups were similar with demographic parameres as age and weight.

In the lidocaine jelly group hemodynamic changes and emergence reactions were lower than the lubricant jelly group.

Conclusion: Usage of preoperative lidocaine jelly during LMA insertion can decrease hemodynamic changes and emergence reactions frequencies.

Keywords: Lidocaine jelly- Lubricant jelly- LMA- Emergence reactions

*Corresponding author: Department of Anesthesiology, Faculty of medicine, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: m.rafiei@ajaums.ac.ir.