

اثر هشت هفته تمرین هوایی و دو هفته بی تمرینی بر رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند

سید علی حسینی^۱، عبدالصالح زر^۲، ایمان فتحی^۳، زهرا حیدری مهکویه^۴، مرضیه ذالکیان^۴

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران. نویسنده مسئول. ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. ۳- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر^(ع) رفسنجان، ایران. ۴- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.

اطلاعات مقاله	نوع مقاله پژوهشی
<p>چکیده</p> <p>مقدمه: امروزه بیماری‌های قلبی-عروقی از علل شایع مرگ و میر در کشورهای پیشرفته به شمار می‌آید. فیبرینوژن و رزیستین دو مارکر التهابی مهم پیشگوی خطر آترواسکلروز می‌باشند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوایی و دو هفته بی تمرینی بر سطوح رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند می‌باشد.</p> <p>روش کار: ۲۲ مرد سالمند غیرفعال از خانه سالمندان انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه ۱۱ نفره تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه ۳۰ تا ۴۵ دقیقه تمرین هوایی با شدت ۵۵ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. سپس به مدت دو هفته تمرینات خود را قطع نمودند. در کل دوره تحقیق گروه شاهد تنها فعالیت‌های روزمره خود را انجام دادند. خونگیری قبل، پس از هفت هشتم و دهم از تمامی آزمودنی‌ها صورت گرفت. از آزمون‌های کالمولوگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد ($p \leq 0.05$).</p> <p>نتایج: تفاوت معنی داری در تغییرات سطوح رزیستین ($p = 0.40$) و فیبرینوژن ($p = 0.95$) گروه کنترل در هفته‌های اول، هشتم و دهم وجود نداشت. با این وجود، سطوح رزیستین ($p = 0.01$) و فیبرینوژن ($p = 0.001$) گروه تجربی در هفته هشتم به طور معنی داری پایین‌تر از گروه کنترل بود. سطوح فیبرینوژن در هفته دهم به طور معنی داری بالاتر از هفته هشتم بود ($p = 0.001$).</p> <p>بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد هشت هفته تمرین هوایی منجر به کاهش معنی دار رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند می‌گردد، با این وجود پس از دو هفته بی تمرینی سطوح کاهش یافته فیبرینوژن دوباره افزایش می‌یابد.</p>	<p>تاریخچه مقاله</p> <p>دریافت: ۹۷/۹/۵</p> <p>پذیرش: ۹۸/۲/۱۰</p>
<p>کلید واژگان</p> <p>تمرین هوایی، بی تمرینی، رزیستین، فیبرینوژن، سالمندی</p>	
<p>نویسنده مسئول</p> <p>Email: alihoseini_57@miau.ac.ir</p>	

زندگی بی تحرک از عوامل خطرساز در بروز بیماری آترواسکلروز شناخته شده‌اند، تصور بر این بود که با کنترل این عوامل بویژه هایپرکلسترولمی و پرفسارخونی می‌توان ابتلا به بیماری‌های کرونری را محدود ساخت. اما وجود عوامل مهم دیگری موجب تغییر نگرش به این بیماری شد (۱)، بطوریکه مشاهده شده است تقریباً ۵۰ درصد سکته‌های قلبی میان افراد بدون هایپرلیپیدمی رخ می‌دهد. در یک مطالعه‌ی آینده نگر روی زنان آمریکایی، ۷۷٪ بیماری‌های قلبی-عروقی در بیماران با سطح پایین LDL گزارش شد (۵). همچنین در مطالعه‌ای دیگر که روی ۱۲۰۰۰ بیمار شریان کرونری انجام شد، ۱۹٪ مردان و ۱۵٪ زنان نشانه‌ای از هایپرلیپیدمی، فشارخون، دیابت و سیگار نداشتند و بیش از ۵۰٪ فقط یکی از این عوامل را داشتند (۶). از این‌رو با تحقیقات حیوانی، کلینیکی و اپیدمیولوژیکی که طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر انجام شده است، مشخص شد که التهاب و مکانیزم‌های سلولی و مولکولی آن در فرایندهای آتروز ن نقش عمده‌ای دارند. دو مارکر التهابی

مقدمه امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر شیوه زندگی مردم، بیماری‌های بسیاری از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی و سلطان‌ها شیوع یافته‌اند و مرگ و میرهای زودرس ناشی از آنها از عوارض جانبی آن می‌باشد (۱). در بیشتر موارد، بیماری زودرس عروق کرونر رابطه‌ای مستقیم با تعداد و شدت ریسک فاکتورهای آترواسکلروز دارند (۲). از دیدگاه اپیدمیولوژیکی ریسک فاکتور، ویژگی یک فرد یا یک جمعیت است که در زندگی آنها وارد می‌شود و منجر به افزایش خطر بیماری در آینده می‌شود. ریسک فاکتور ممکن است یک رفتار اکتسابی مانند سیگار کشیدن، یک ویژگی ارثی مثل هایپرلیپیدمی خانوادگی و یا یک مارکر آزمایشگاهی مانند کلسترول و پروتئین واکنشی- C (C-PCR) است که تحت القاء IL-6 در سلول‌های کبدی تولید می‌شود (۳). ریسک فاکتورها باید قبل از آغاز بیماری تشخیص داده شوند (۳)، با توجه به این‌که هایپرکلسترولمی، دیابت، کشیدن سیگار، چاقی، پرفسارخونی و

همکاران (۲۰۰۹) تاثیر هشت ماه تمرین هوایی را بر سطوح رزیستین، آدیپونکتین، گلوکز، انسولین، کلسترول تام، HDL، LDL، تری گلیسیرید، لپتین، گرلین فعال و پپتید YY در نوجوانان دارای اضافه وزن بررسی کردند و تاثیرات مطلوب این برنامه تمرینی را گزارش کردند. آنها نشان دادند که هشت ماه تمرین هوایی منظم می‌تواند باعث کاهش سطوح رزیستین شود (۲۰). در مطالعه‌ای دیگر کوشنیک و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که ۱۲ هفته تمرین قدرتی موجب تغییر معنی داری در سطوح فیبرینوژن، تری گلیسیرید و کلسترول تام در زنان و مردان دانشجو نمی‌شود (۲۱). بور و همکاران (۲۰۰۱) به بررسی تاثیر ۱۵ هفتۀ تمرین استقامتی بر سطوح فیبرینوژن در زنان یائسه پرداختند و افزایش معنی‌دار این مارکر التهابی و انعقادی را پس از پایان تمرینات گزارش نمودند (۲۲). مطالعاتی که در دهه اخیر درباره ارتباط بین رزیستین و مقاومت انسولین (یکی از ریسک فاکتورهای مهم آترواسکلروز) انجام شده است، نتایج بسیار متناقضی را نشان داده اند (۲۳). در این مطالعات مشخص شده است که رزیستین در موش‌ها فقط از بافت چربی ترشح شده و ارتباط مستقیمی با مقاومت انسولین دارد، ولی در انسان‌ها علاوه بر بافت چربی، از مونوسیت‌ها، ماکروفازها و سلول‌های تک هسته ای خون نیز ترشح می‌شود و ارتباط آن با مقاومت انسولین هنوز به طور واضح مشخص نشده است و این به دلیل تناقض در یافته‌های مطالعات انجام شده می‌باشد. برخی تحقیقات ارتباط مستقیم (۲۴-۲۹)، برخی عدم ارتباط (۱۰، ۳۰-۳۴) و حتی برخی تحقیقات ارتباط معکوس (۳۵ و ۳۶) این هورمون با مقاومت انسولین را نشان داده اند (۳۵). لذا با توجه به اینکه فعالیت بدنی می‌تواند عوارض ناشی از افزایش سر را کاهش دهد و همچنین با توجه به این نتایج متناقض در مطالعات انسانی و از آنجا که تاثیر مطلوب ورزش هوایی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی و مقاومت انسولین ثابت شده و ورزش به عنوان یک راهبرد درمانی برای دیابت و آترواسکلروز به کار می‌رود، تحقیق درباره تاثیر ورزش منظم هوایی بر سطوح رزیستین می‌تواند نتایج مهمی را فراهم کند. با توجه به اهمیت سلامت قلب و عروق به خصوص در دوران سالمندی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفتۀ تمرین هوایی بر سطوح فاکتورهای مذکور در مردان سالمند غیرفعال می‌باشد.

روش کار

پژوهش حاضر نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش را ۲۲ نفر از مردان سالمند سالم غیرفعال ساکن در خانه سالمندان تشکیل داد. شرایط ورود به پژوهش شامل عدم وجود هر گونه بیماری قلبی-عروقی، کلیوی، کبدی و مصرف نکردن عامل‌های دخانیات و

مهم فیبرینوژن و رزیستین هستند که باعث آسیب و عفونت بافتی و توسعه آترواسکلروز می‌گردند (۷-۹). رزیستین یک هورمون پپتیدی غنی از سیستین است که دارای ۱۰۸ آمینو اسید می‌باشد. در افراد دیابتی و چاق سطح این هورمون بالا می‌باشد. در انسان‌ها این هورمون عمدها در سلول‌های التهابی و چربی ساخته می‌شود. این هورمون ارتباط مستقیمی با خطر آترواسکلروز و سطوح hSCRP (۸ و ۱۰) رزیستین از طریق اختلال در متابولیسم گلوکز و لیپید موجب افزایش خطر آترواسکلروز می‌شود. همچنین با تحریک سایتوکین‌های پیش التهابی موجب افزایش آسیب پذیری پلاک‌های آتروسکلروزی می‌گردد (۱۱). طبق یافته‌های سو و همکاران (۲۰۰۶)، رزیستین از طریق افزایش بیان (ژن) CD36 نوعی پروتئین اینتگرال غشایی که در بیشتر سلول‌ها وجود دارد و در ایجاد بیماری‌های قلبی و متابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب موثر است) موجب انباشت لیپید در ماکروفازها و تشکیل سلول‌های کف دار در دیواره‌های عروق می‌شود (۱۲). از سویی دیگر، فیبرینوژن یکی از فاکتورهای اساسی در روند انعقاد است. مایع میان بافتی به طور معمول، منعقد نمی‌شود. با وجود این وقتی نفوذپذیری مویرگ‌ها بطور پاتولوژیک زیاد شود، فیبرینوژن به داخل مایع میان بافتی نشست می‌کند به حدی که این مایعات نیز تقریباً شبیه پلاسمما و خون کامل می‌توانند لخته شوند. افزایش سن، تأثیر نامناسبی بر سیستم انعقاد و فیبرینولیز دارد. افزایش سن باعث افزایش فاکتور فیبرینوژن، (بازدارنده‌ی فعل کننده پلاسمینوژن نوع ۱ PAI-1 و هموسیستین می‌شود (۱۳). همچنین افزایش سن همراه با کاهش کنترل پاراسمپاتیک ضربان قلب و نقصان واکنش به فعالیت سمپاتیک می‌باشد (۱۴ و ۱۵). این موارد باعث افزایش قدرت انعقاد و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی می‌شود (۱۳). به این ترتیب سالمندی را با کاهش کیفیت زندگی همراه دانسته اند (۱۶). فیبرینوژن در تجمع پلاکت‌ها، آسیب اندوتیلیوم، فرایندهای انعقادی، ویسکوزیته خون و تجمع سلول‌های قرمز خون نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. هنگام التهاب که سطوح IL-6 پلاسمما افزایش می‌یابد، سطوح فیبرینوژن نیز زیاد می‌شود (۱۷). فعالیت بدنی ارتباط مستقیم با کاهش بروز بیماری‌های قلبی-عروقی دارد. بهبود پاسخ فیبرینولیتیک و کاهش فعالیت سیستم انعقاد در مردان سالمند متعاقب تمرین هوایی گزارش شده است (۱۸). تحقیقات اندکی در رابطه با تاثیر ورزش بر سطوح رزیستین بخصوص در افراد سالمند شده است و نتایج نسبتاً متفاوتی گزارش شده است. به عنوان مثال، جمور تاز و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کردند که یک جلسه تمرین هوایی با شدت زیربیشینه در مردان سالم و دارای اضافه وزن تغییر معنی‌داری در سطوح آدیپونکتین و رزیستین تا ۴۸ ساعت پس از تمرین ایجاد نکرد (۱۹). جونز و

نمونه‌گیری خونی (۱۰ سی سی از ورید بازویی)، ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و ۲۴ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین صورت گرفت. برای کنترل ریتم شبانه‌روزی، تمام نمونه‌گیری‌ها در ساعت ۸ صبح و بصورت ناشتا انجام گرفت. نمونه‌ها در لوله‌های حاوی ضد انقاد اتیلن دایامین تراستیک اسید (EDTA) ۲٪. جمع آوری و به سرعت سانتریفیوژ (سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه) شدند و پلاسمای به دست آمده تا زمان آزمایش در فریزر و در دمای -۸۰ درجه سانتی‌گراد نگه داری می‌شد. سطوح فیبرینوژن با استفاده از کیت مخصوص فیبرینوژن انسانی و دستگاه کواگلومتر اندازه گیری شد.

رزیستین سرم نیز با استفاده از کیت مخصوص Elisa kit (Ray Biotech, Inc.), Sensitivity: Ray Bio human 0/01 ng/ml

روش الایزا ساندویچی:

(Sandwich enzyme-linked immunosorbent assay) اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS/19 استفاده شد. همچنین جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف و جهت تجزیه و تحلیل آنها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد ($p \leq 0.05$).

نتایج

جدول ۱ مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان و جدول ۲ سطوح رزیستین و فیبرینوژن آزمودنی‌های گروه‌های تجربی و شاهد در هفته‌های اول، هشتم و دهم را نشان می‌دهد.

الکل بود. همچنین آزمودنی‌ها در حال درمان با داروهای استروئیدی و رژیم‌های غذایی خاص نبودند و تا زمان انجام این پژوهش نیز سابقه انجام تمرین منظم را نداشتند. سپس آزمودنی‌های واجد شرایط بطور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی (۱۱ نفر) و گروه شاهد (۱۱ نفر) تقسیم شدند. قد، وزن، توان هوازی (با استفاده از آزمون یک مایل راکپورت)، و فشار خون اندازه گیری شد (جدول ۱ را ببینید). در ادامه آزمودنی‌ها بر اساس توان هوازی به دو گروه همسان ۱۱ نفره تجربی و شاهد تقسیم شدند. قبل از شروع تحقیق پرسشنامه سلامتی و فرم رضایت نامه آگاهانه تکمیل شد.

پروتکل ورزشی: گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرین ورزشی هوازی را انجام دادند سپس به مدت دو هفته تمرینات خود را قطع نمودند. در طول این مدت گروه شاهد فقط فعالیت‌های روزمره خود را انجام دادند. برنامه تمرینی گروه تجربی شامل هشت هفته تمرین هوازی دویden، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه فعالیت ورزشی با شدت ۵۵ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب بود. تمرین گروه تجربی در هر جلسه شامل سه مرحله بود: مرحله گرم کردن (این مرحله شامل شش دقیقه دویden آرام و چهار دقیقه حرکات کششی و نرمش در هر جلسه بود)، مرحله تمرینات اختصاصی (برنامه تمرین هوازی شامل ۲۰ دقیقه دویden با شدت ۵۵ تا ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب در چهار هفته اول در هر جلسه آغاز شد، پس از آن، مدت تمرین به ۲۶ دقیقه و شدت به ۶۵ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب افزایش یافت) و مرحله سرد کردن (سرد کردن در پایان شامل سه تا چهار دقیقه دویden نرم و راه رفتن و سپس پنج دقیقه حرکات کششی بعد از هر جلسه تمرین بود). جهت کنترل شدت تمرین، از ضربان سنج استفاده شد.

جدول ۱- ویژگی‌های آزمودنی‌ها و میزان تفاوت‌های بین دو گروه قبل از آغاز تحقیق

سن	قد	وزن	شاخص توده بدنی (BMI)	فشار خون سیستولی (SBP)	فشار خون دیاستولی (DBP)
گروه شاهد	۶/۶۶ ± ۲/۳	۶۳/۸ ± ۳/۲	گروه تجربی	۱۷۴ ± ۲۱	۱۷۲ ± ۳۶
گروه شاهد	۷۳/۱ ± ۷/۶	۷۱/۳۱ ± ۳/۳	گروه شاهد	۲۳/۱ ± ۲/۵	۲۳/۵ ± ۱/۱
گروه شاهد	۷۱/۳۱ ± ۳/۳	۷۱/۳۱ ± ۳/۳	گروه تجربی	۱۲۶ ± ۸/۲	۱۲۲ ± ۸
گروه شاهد	۲۳/۱ ± ۲/۵	۲۳/۵ ± ۱/۱	گروه شاهد	۸۷/۷ ± ۸	۸۴ ± ۹/۷
گروه تجربی	۱۷۲ ± ۳۶	۱۷۴ ± ۲۱	گروه شاهد	۱۲۲ ± ۸	گروه شاهد
۶۳/۸ ± ۳/۲	۶/۶۶ ± ۲/۳	۷۳/۱ ± ۷/۶	گروه تجربی	۸۷/۷ ± ۸	گروه تجربی

جدول ۲- سطوح رزیستین و فیبرینوژن گروه های تجربی و شاهد در هفته های اول، هشتم و دهم

گروه	متغیر	هفته اول	هفته هشتم	هفته دهم
تجربی	رزیستین	۵۱۰۳/۷۲±۷۱/۱۷	۵۰۰۷/۱۸±۶۹/۱۰*	۵۰۴۱/۴۵±۶۸/۳/۲۰
	فیبرینوژن	۲۲۵/۳۶±۶۷/۸۴	۱۵۶/۳۶±۵۵/۴۵*	۲۰۹/۵۴±۵۳/۸۲**
شاهد	رزیستین	۴۹۸۷/۳۶±۷۲۶/۶۱	۴۹۵۹/۷۲±۷۴۱/۳۲	۴۹۵۹/۷۲±۷۴۱/۳۲
	فیبرینوژن	۱۷۰/۱۸±۴۴/۸۳	۱۶۹/۸۱±۴۳/۶۳	۱۶۹/۸۱±۴۳/۶۳

* افزایش معنی دار نسبت به هفته هشتم

** کاهش معنی دار نسبت به هفته اول

ارتباط سطوح فیبرینوژن با فعالیت ورزشی می باشدند. به عنوان مثال، در یک مطالعه مقطعی مینت و همکاران (۲۰۰۸) ارتباط معکوسی بین فعالیت بدنه منظم و سطوح فیبرینوژن گزارش کردند (۳۹). طبق نتایج مطالعات قبلی، سن و جنس آزمودنی ها و نوع و مدت و شدت تمرین عوامل مؤثری در پاسخ فیبرینوژن به ورزش منظم می باشدند. فیبرینوژن ارتباط مستقیمی با استرس، چاقی و LDL و ارتباط معکوسی با LDL دارد. بنابراین افزایش HDL و کاهش LDL، استرس و درصد چربی که در نتیجه تمرینات هوایی حاصل می شود، می تواند موجب کاهش فیبرینوژن شود. همچنین تمرینات منظم هوایی از طریق کاهش تحريكات کاتکولامینی و افزایش جریان خون عضلات و همچنین افزایش کلی حجم خون می تواند موجب کاهش غلظت فیبرینوژن در خون شود (۳۸). سطوح رزیستین آزمودنی های گروه تجربی این تحقیق پس از هشت هفته تمرین هوایی کاهش معنی داری یافت. نتایج این تحقیق با نتایج پر زگین، کلی و مونزیلو مغایر (۳۵، ۴۱-۴۰) و با نتایج جونز، الومی، کاداگلو، بالدوسی و زلبرسائی (۴۳-۴۵، ۴۲، ۲۰) همسو بود. جونز و همکاران (۲۰۰۹) تأثیر هشت ماه تمرین هوایی منظم را بر سطوح لیپیدهای سرم، لپتین، آدیبونکتین، رزیستین، پپتید YY و گرلین در نوجوانان دچار اضافه وزن بررسی کرده و کاهش معنی دار رزیستین را گزارش نمودند (۲۰). همچنین کاداگلو و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر ۱۶ هفته تمرین هوایی منظم با شدت ۵۰ تا ۸۵ درصد $V0_{2\max}$ بر سطوح رزیستین در بیماران دچار دیابت نوع ۲ و دارای اضافه وزن پرداختند و کاهش معنی دار این هورمون را در آنها نشان دادند (۴۳). علاوه بر این، زلبرسائی و همکاران (۲۰۰۸) اظهار نمودند که در بیماران دچار کبد چرب غیرالکلی، ارتباط معکوس و معنی داری بین تمرین مقاومتی حداقل یک جلسه در هفته و سطوح رزیستین وجود دارد (۴۵). در مطالعه الومی و همکاران (۲۰۰۹) نیز دو ماه تمرین ورزشی همراه با کاهش وزن موجب کاهش معنی دار رزیستین در نوجوانان چاق شد (۴۲). همچنین بالدوسی و همکاران (۲۰۱۰) گزارش کردند که در بیماران دچار دیابت و اضافه وزن، ۱۲ ماه فعالیت بدنه

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری نشان داد تفاوت معنی داری در سطوح رزیستین ($F=۹/۰۷$ ، $p=۰/۰۰۲$) و فیبرینوژن ($F=۳۶/۹۱$ ، $p=۰/۰۰۱$) گروه تجربی در هفته های اول، هشتم و دهم وجود دارد. نتایج آزمون تعییبی بونفرونی نشان داد سطوح رزیستین در هفته هشتم به طور معنی داری پایین تر از هفته اول بود ($p=۰/۰۱$) با این وجود، تفاوت معنی داری در سطوح رزیستین بین هفته اول با هفته دهم ($p=۰/۰۷$) و هفتۀ دهم با هفته هشتم ($p=۰/۱۶$) وجود نداشت (جدول ۲). همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری نشان داد که تفاوت معنی داری در سطوح رزیستین ($p=۰/۴۰$) و فیبرینوژن ($F=۰/۹۳$ ، $p=۰/۹۵$) گروه کنترل در هفته های اول، هشتم و دهم وجود ندارد (جدول ۲). به علاوه نتایج این آزمون نشان داد سطوح فیبرینوژن در هفته هشتم به طور معنی داری پایین تر از هفته اول است ($p=۰/۰۱$) و در هفته دهم به طور معنی داری بالاتر از هفته هشتم است (۴۶) فیبرینوژن بین هفته اول با دهم وجود نداشت ($p=۰/۱۷$) (جدول ۲).

بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که هشت هفته تمرین هوایی منجر به کاهش معنی دار سطوح فیبرینوژن پلاسمما می شود. با این وجود، نتایج این تحقیق با برخی مطالعات مغایر بود. به عنوان نمونه نیکبخت و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی همبستگی میزان فعالیت بدنه با غلظت فیبرینوژن و هموسیستین سرم را در مردان میان سال ۴۰ تا ۵۵ ساله مورد بررسی قرار دادند. آنها آزمودنی ها را به سه گروه فعل، غیرفعال و مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD) تقسیم نمودند. نتایج نشان داد که بین میزان فعالیت بدنه و غلظت هموسیستین و فیبرینوژن ارتباط معنی داری وجود ندارد (۳۷). همچنین فروکاوا و همکاران (۲۰۰۸) تأثیر ۱۲ هفته برنامه پیاده روی را بر سطوح فیبرینوژن زنان ۳۲ تا ۵۷ ساله بررسی نموده و گزارش کردند که این فاکتور تغییر معنی داری پس از تمرینات نداشت (۴۸). با این وجود، همانند نتایج این تحقیق، بیشتر مطالعات حاکی از

توجیه کرد. در مجموع تحقیقات حاکی از ارتباط رزیستین با مقاومت انسولین می باشد و تعامل معنی داری بین پلی مورفیسم یک نوکلئوتید منفرد در پیش برنده ژن رزیستین NAD(P)H به (Quinine Oxidoreductase-I) (P)H to Quinone (Oxidoreductase-I ratio) مقاومت انسولین کشف شده است. بنابراین درصد چربی افراد و مقاومت انسولینی نقش مهمی در پاسخ رزیستین به تمرين ورزشی دارد. البته در این تحقیق مقاومت انسولینی اندازه گیری شده بود. به هر حال پژوهش های بیشتری برای تعیین ارتباط مقاومت انسولین با رزیستین در انسان و نیز تاثیر انواع برنامه های ورزشی بر سطوح این فاکتور باید صورت گیرد. در پایان، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرين هوازی می تواند سطوح فیربینوژن و رزیستین (که از مارکرهای بیماری های قلبی-عروقی می باشند) را در افراد سالمند کاهش دهد. بنابراین احتمالاً افراد سالمند می توانند با قرار دادن ورزش های هوازی در برنامه روزمره اشان از مزایای آن بهره برند و احتمالاً کمتر درگیر بیماری های قلبی-عروقی شوند.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از تمامی آزمودنی های که در مطالعه حاضر شرکت نمودند تشکر و قدردانی می گردد.

منظمه موجب کاهش رزیستین می شود (۴۴). با این وجود، همانطور که اشاره شد نتایج برخی تحقیقات حاکی از افزایش سطوح رزیستین ناشی از تمرينات ورزشی بوده است. مونزیلو و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که شش ماه فعالیت بدنی با شدت متوسط موجب افزایش رزیستین در افراد سالم و بیماران دیابتی نوع ۲ می شود (۴۱). در مطالعه ای دیگر، پرزگین و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند که ورزشکاران استقامتی دارای سطوح رزیستین بیشتری نسبت به افراد غیرفعال بودند (۳۵). دلایل قطعی و مشخص این تنافضات مشخص نیست ولی می تواند به شدت، مدت، نوع ورزش، ویژگی های آنتروپومتریکی، سنی و فیزیولوژیکی و سطح آمادگی آزمودنی ارتباط داشته باشد. همچنین می توان به نقش های مختلف رزیستین از افزایش مقاومت انسولینی (نقش منفی) تا دفاع آنتی اکسیدانی (نقش مثبت) نیز اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل احتمالی نقش سایتوکاین ها می باشد. سایتوکین های پیش التهابی نظیر IL-6، IL-1 و TNF- α موجب تحریک بیان ژن رزیستین در سلول های تک هسته ای خون می شوند (۲۵) و از آن جا که نتایج متنافقی درباره تاثیر ورزش منظم بر سطوح TNF- α وجود دارد (۴۱) می توان پاسخ های متنافق رزیستین به ورزش را به این سایتوکین نیز نسبت داد. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم رزیستین با آدیپونکتین (۲۵)، و با توجه به افزایش آدیپونکتین در نتیجه تمرينات ورزشی، می توان افزایش آنرا در این بخش

References

- 1-Cinteza M, Pana B, Cochino E, Florescu M, Margulescu A, Florian A, et al. Prevalence and control of cardiovascular risk factors in Romania cardio-zone national study. *Mædica J Clin Med* 2007;2(4):277-88.
- 2-Kuulasmaa K, Tunstall-Pedoe H, Dobson A, Fortmann S, Sans S, et al. Estimation of contribution of changes in classic risk factors to trends in coronary-event rates across the WHO MONICA Project populations. *Lancet* 2000; 355(9205):675-87.
- 3-Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, editors. Libby: Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 9th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008.
- 4-Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. *New Engl J Med* 2005;352(16):1685-95.
- 5-Ridker PM, Rifai N, Rose L, Buring JE, Cook NR. Comparison of C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction of first cardiovascular events. *N Engl J Med* 2002;347(20):1557-65.
- 6-Khot UN, Khot MB, Bajzer CT, Sapp SK, Ohman EM, Brener SJ, et al. Prevalence of conventional risk factors in patients with coronary heart disease. *JAMA* 2003;290(7):898-904.
- 7-Hackam DG, Anand SS. Emerging risk factors for atherosclerotic vascular disease: a critical review of the evidence. *JAMA* 2003;290(7):932-40.
- 8-Kopff B, Jegier A. Adipokines: adiponectin, leptin, resistin and coronary heart disease risk. *Przegl Lek* 2005;62 Suppl 3:69-72.
- 9-Hughes S. Novel cardiovascular risk factors. *J Cardiovasc Nurs* 2003;18(2):131-8.
- 10-Hoefle G, Saely CH, Risch L, Koch L, Schmid F, Rein P, et al. Relationship between the adipose-tissue hormone resistin and coronary artery disease. *Clin Chim Acta* 2007;386 (1-2):1-6.
- 11-Wang H, Chen DY, Cao J, He ZY, Zhu BP, Long M. High serum resistin level may be an indicator of the severity of coronary disease in acute coronary syndrome. *Chin Med Sci J* 2009;24(3):161-6.
- 12-Xu W, Yu L, Zhou W, Luo M. Resistin increases lipid accumulation and CD36 expression in human macrophages. *Biochem Biophys Res Commun* 2006;351(2):376-82.
- 13-Kumar A, Kar S, Fay WP. Thrombosis, physical activity, and acute coronary syndromes. *J Appl Physiol* 2011; 111:599-605.
- 14-Wilkerson WR, Sane DC. Aging and thrombosis. *Semin Thromb Hemost* 2002; 28:555-568.
- 15-Silverstein RL, Bauer KA, Cushman M, Esmon CT, Ershler WB, Tracy RP. Venous thrombosis in the elderly: more questions than answers. *Blood* 2007; 110:3097-3101.
- 16-Engbers MJ, van Hylckama Vlieg A, Rosendaal FR. Venous thrombosis in the elderly: incidence, risk factors and risk groups. *J Thromb Haemost* 2010; 8:2105-2112.
- 17-Reinhart WH. Fibrinogen--marker or mediator of vascular disease? *Vasc Med* 2003;8(3):211-6.
- 18-Hilberg T, Gläser D, Reckhart C, Prasa D, Stürzebecher J, Gabriel HH. Blood coagulation and fibrinolysis after long-duration treadmill exercise controlled by individual anaerobic threshold. *Eur J Appl Physiol* 2003; 90:639-642.
- 19-Jamurtas AZ, Theocharis V, Koukoulis G, Stakias N, Fatouros IG, Kouretas D, et al. The effects of acute exercise on serum adiponectin and resistin levels and their relation to insulin sensitivity in overweight males. *Eur J Appl Physiol* 2006;97(1):122-6.
- 20-Jones TE, Basilio JL, Brophy PM, McCammon MR, Hickner RC. Long-term exercise training in overweight adolescents improves plasma peptide YY and resistin. *Obesity (Silver Spring)* 2009;17(6):1189-95.
- 21-Kushnick MR, DeRuisseau KC, Roberts LM, Jones EM, Stamford BA, Moffatt RJ. Blood lipids and fibrinogen levels of college-aged individuals following twelve weeks of strength training. *Med Sci Sports Exerc* 2003;35(5):S368.
- 22-Borer KT, Huang J, Sanford T, Fay W. Increased plasma fibrinogen and decreased plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) after 15 weeks of training in postmenopausal women. *Med Sci Sports Exerc* 2001;33(5):S51.
- 23-Kusminski CM, McTernan PG, Kumar S. Role of resistin in obesity, insulin resistance and Type II diabetes. *Clin Sci (Lond)* 2005;109 (3):243-56.
- 24-Hivert MF, Sullivan LM, Fox CS, Nathan DM, D'Agostino RB Sr, Wilson PW, et al. Associations of adiponectin, resistin, and tumor necrosis factor-alpha with insulin resistance. *J Clin Endocrinol Metab* 2008;93(8):3165-72.
- 25-Qi Q, Wang J, Li H, Yu Z, Ye X, Hu FB, et al. Associations of resistin with inflammatory and fibrinolytic markers, insulin resistance, and metabolic syndrome in middle-aged and older Chinese. *Eur J Endocrinol* 2008;159(5):585-93.
- 26-Silha JV, Krsek M, Skrha JV, Sucharda P, Nyomba BL, Murphy LJ. Plasma resistin, adiponectin and leptin levels in lean and obese subjects: correlations with insulin resistance. *Eur J Endocrinol* 2003;149(4):331-5.

- 27-Steppan CM, Bailey ST, Bhat S, Brown EJ, Banerjee RR, Wright CM, et al. The hormone resistin links obesity to diabetes. *Nature* 2001;409(6818):307-12.
- 28-Azuma K, Katsukawa F, Oguchi S, Murata M, Yamazaki H, Shimada A, et al. Correlation between serum resistin level and adiposity in obese individuals. *Obes Res* 2003;11(8):997-1001.
- 29-Rong L, Xiao-ping LI, Yan Z. Serum resistin and adiponectin concentrations in patients with overweight and obesity. *J Med Coll PLA* 2007;22(3):160-4.
- 30-Degawa-Yamauchi M, Bovenkerk JE, Julian BE, Watson W, Kerr K, Jones R, et al. Serum resistin (FIZZ3) protein is increased in obese humans. *J Clin Endocrinol Metab* 2003;88(11):5452-5.
- 31-Lee JH, Chan JL, Yiannakouris N, Kontogianni M, Estrada E, Seip R, et al. Circulating resistin levels are not associated with obesity or insulin resistance in humans and are not regulated by fasting or leptin administration: cross-sectional and interventional studies in normal, insulin-resistant, and diabetic subjects. *J Clin Endocrinol Metab* 2003;88(10):4848-56.
- 32-Youn BS, Yu KY, Park HJ, Lee NS, Min SS, Youn MY, et al. Plasma resistin concentrations measured by enzyme-linked immunosorbent assay using a newly developed monoclonal antibody are elevated in individuals with type 2 diabetes mellitus. *J Clin Endocrinol Metab* 2004;89(1):150-6.
- 33-Chen CC, Li TC, Li CI, Liu CS, Wang HJ, Lin CC. Serum resistin level among healthy subjects: relationship to anthropometric and metabolic parameters. *Metabolism* 2005;54(4):471-5.
- 34-Rubin DA, McMurray RG, Harrell JS, Hackney AC, Thorpe DE, Haqq AM. The association between insulin resistance and cytokines in adolescents: the role of weight status and exercise. *Metabolism* 2008;57(5):683-90.
- 35-Perseghin G, Burska A, Lattuada G, Alberti G, Costantino F, Ragogna F, et al. Increased serum resistin in elite endurance athletes with high insulin sensitivity. *Diabetologia* 2006;49(8):1893-900.
- 36-Domínguez Coello S, Cabrera de León A, Almeida González D, González Hernández A, Rodríguez Pérez MC, Fernández Ramos N, et al. Inverse association between serum resistin and insulin resistance in humans. *Diabetes Res Clin Pract* 2008;82(2):256-61.
- 37-Nikbakht HA, Amirtash AM, Gharouni H, Zafari A. Comparison of physical activity with serum fibrinogen and homocysteine concentration in active, sedentary and with CAD males. *Olympic* 2007;15(38):71-80.
- 38-Furukawa F, Kazuma K, Kojima M, Kusukawa R. Effects of an off-site walking program on fibrinogen and exercise energy expenditure in women. *Asian Nursing Res* 2008;2(1):35-45.
- 39-Myint PK, Luben RN, Wareham NJ, Welch AA, Bingham SA, Khaw KT. Physical activity and fibrinogen concentrations in 23,201 men and women in the EPIC-Norfolk population-based study. *Atherosclerosis* 2008;198(2):419-25.
- 40-Kelly AS, Steinberger J, Olson TP, Dengel DR. In the absence of weight loss, exercise training does not improve adipokines or oxidative stress in overweight children. *Metabolism* 2007; 56(7):1005-9.
- 41-Monzillo LU, Hamdy O, Horton ES, Ledbury S, Mullooly C, Jarema C, et al. Effect of lifestyle modification on adipokine levels in obese subjects with insulin resistance. *Obes Res* 2003;11(9):1048-54.
- 42-Elloumi M, Ben Ounis O, Makni E, Van Praagh E, Tabka Z, Lac G. Effect of individualized weight-loss programmes on adiponectin, leptin and resistin levels in obese adolescent boys. *Acta Paediatr* 2009;98(9):1487-93.
- 43-Kadoglou NP, Perrea D, Iliadis F, Angelopoulou N, Liapis C, Alevizos M. Exercise reduces resistin and inflammatory cytokines in patients with type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2007;30(3):719-21.
- 44-Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, Fernando F, Cavallo S, Cardelli P, et al. Anti-inflammatory effect of exercise training in subjects with type 2 diabetes and the metabolic syndrome is dependent on exercise modalities and independent of weight loss. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2010;20(8):608-17.
- 45-Zelber-Sagi S, Nitzan-Kaluski D, Goldsmith R, Webb M, Zvibel I, Goldiner I, et al. Role of leisure-time physical activity in nonalcoholic fatty liver disease: a population-based study. *Hepatology* 2008;48(6):1791-8.

The effect of eight weeks of aerobic training and two weeks of detraining on resistin and fibrinogen of elderly male

Hoseini SA (PhD)*, Zar A (PhD), Fathi I (PhD), Heidari Mahkooyeh Z (MSc), Zalekian M (MSc)

Abstract

Aim: Cardiovascular disease is one of the most common causes of mortality in advanced countries today. Fibrinogen and resistin are two important markers of inflammation that predict atherosclerosis. The aim of this study was to investigate the effect of eight-week aerobic training and two weeks of detraining on the levels of resistin and fibrinogen in elderly men.

Methods: 22 inactive elderly men were selected from nursing homes and randomly divided into experimental and control groups of 11. The experimental group performed an aerobic exercise with 55% to 70% of maximum heart rate for 8 weeks, 3 sessions per week and 30-45 minutes in each session. Then they stopped their training for two weeks. In the entire study period, the control group performed their daily activities only. Blood samples were taken before, after the eighth and tenth weeks. The Kolmogorov-Smirnov test, repeated ANOVA and Bonferroni's post hoc test were used to analyze of the data ($p \leq 0.05$).

Results: There was no significant difference in the level of resistin ($p = 0.40$) and fibrinogen ($p = 0.95$) changes in the control group in the first, eighth and tenth weeks. However, the levels of resistin ($p = 0.01$) and fibrinogen ($p = 0.001$) in the experimental group were significantly lower in the 8th weeks than in the control group. Fibrinogen levels in the 10th weeks were significantly higher than the eighth weeks ($p = 0.001$).

Conclusion: It appears that eight weeks of aerobic training led to a significant reduction in the resistin and fibrinogen in older men. However, after two weeks of detraining, the levels of reduced fibrinogen increased again.

Key words: Aerobic training, Exercise, Resistin, Fibrinogen, Elderly

*Corresponding Author, Department of Sport Physiology, Marvdash Islamic Azad University, Marvdasht, Iran. Email: alihoseini_57@miau.ac.ir